

Kurvendiskussion

1. Definitionsmenge

Die Definitionsmenge einer Funktion ist die Menge der Zahlen, denen durch die Funktion ein Wert zugeordnet werden kann.

2. Nullstellen

Die Nullstellen einer Funktion f sind alle $x \in D$, für die $f(x) = 0$ gilt.

3. Symmetrie

Der Graph einer Funktion f ist symmetrisch zur y -Ache, wenn $f(-x) = f(x)$ gilt.

Der Graph einer Funktion f ist punktsymmetrisch zu $O(0; 0)$, wenn $f(-x) = -f(x)$ gilt.

4. Grenzwertverhalten

Folgende Grenzwerte sind gegebenenfalls zu untersuchen

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ oder $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ (rechtseitiger Grenzwert) oder $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ (linksseitiger Grenzwert)

Eine Funktion f heißt in $x_0 \in D$ stetig, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$

5. Monotonie

Eine Funktion heißt in ihrem Definitionsbereich D streng monoton zunehmend, wenn

für alle $x_1, x_2 \in D$ mit $x_1 < x_2$ die Ungleichung $f(x_1) < f(x_2)$ folgt.

Für eine auf dem Intervall $I = [a; b]$ stetige und auf $I_0 =]a; b[$ differenzierbare Funktion f gilt

$$f'(x) > 0 \text{ für alle } x \in I_0 \Rightarrow f \text{ ist in } I \text{ streng monoton zunehmend}$$

Eine Funktion heißt in ihrem Definitionsbereich D streng monoton abnehmend, wenn für alle $x_1, x_2 \in D$ mit $x_1 < x_2$ die Ungleichung $f(x_1) > f(x_2)$ folgt.

Für eine auf dem Intervall $I = [a; b]$ stetige und auf $I_0 =]a;b[$ differenzierbare Funktion f gilt

$$f'(x) < 0 \text{ für alle } x \in I_0 \Rightarrow f \text{ ist in } I \text{ streng monoton abnehmend}$$

Beachte :

Die letzten beiden Sätze gelten nur für Intervalle.


Für die Funktion $f : x \rightarrow \frac{1}{x^2}$

mit der Definitionsmenge $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$$

auf D , aber f ist auf D nicht monoton abnehmend,

$$-1 < 1, \text{ aber } f(-1) < f(1).$$



6. Extremwerte : Hoch- und Tiefpunkte

Ein Punkt $E(x_0; f(x_0))$ heißt Hochpunkt des Graphen von f , wenn es ein offenes Intervall I_0 gibt, so dass $f(x) < f(x_0)$ für alle $x \in I_0 \cap D$ ist.

Ein Punkt $P(x_0; f(x_0))$ heißt Tiefpunkt des Graphen von f , wenn es ein offenes Intervall I_0 gibt, so dass $f(x) > f(x_0)$ für alle $x \in I_0 \cap D$ ist.


Beispiele :

Die Punkte $T(-2; -4)$ und $H(3; \frac{7}{2})$ sind Tief-

bzw. Hochpunkt des Graphen der Funktion

$$f: x \rightarrow \frac{3}{2}x - 1 \text{ mit } D = [-2; 3].$$


Man spricht von Randextrema.



Der Punkt $T(1; -2)$ ist Tiefpunkt des Graphen der Funktion

$$f: x \rightarrow |x - 1| - 2 \text{ mit } D = \mathbb{R}.$$

f ist in $x = 1$ nicht differenzierbar.



Für eine auf einem offenen Intervall I_0 definierte und differenzierbare Funktion f gilt

- a) Ist $f'(x_0) = 0$ und ändert f in x_0 sein Monotonieverhalten, dann ist $E(x_0; f(x_0))$ Hoch- oder Tiefpunkt des Graphen von f .
- b) Ist $f'(x_0) = 0$ und ändert f in x_0 sein Monotonieverhalten nicht, dann ist $E(x_0; f(x_0))$ Terrassenpunkt des Graphen von f .

7. Krümmungsverhalten und Wendepunkte

Für eine auf dem Intervall $I = [a; b]$ stetige und auf $I_0 =]a; b[$ zweimal differenzierbare Funktion f gilt

$$f''(x) > 0 \text{ für alle } x \in I_0 \Rightarrow f \text{ ist auf } I \text{ linksgekrümmt}$$



Für eine auf dem Intervall $I = [a; b]$ stetige und $I_0 =]a; b[$ zweimal differenzierbare Funktion f gilt

$$f''(x) < 0 \text{ für alle } x \in I_0 \Rightarrow f \text{ ist auf } I \text{ rechtsgekrümmt}$$

Ist die Funktion f auf dem offenen Intervall $I_0 =]a; b[$ definiert und ist $x_0 \in I_0$, dann heißt $W(x_0; f(x_0))$ ein Wendepunkt des Graphen von f , wenn gilt

a) f ist auf $]a; x_0[$ rechtsgekrümmt und auf $]x_0; b[$ linksgekrümmt.

Beispiele :



oder

b) f ist auf $]a; x_0[$ linksgekrümmt und auf $]x_0; b[$ rechtsgekrümmt.

Für eine auf einem offenen Intervall I_0 definierte und zweimal differenzierbare Funktion f gilt

Ist $f''(x_0) = 0$ und ändert f in x_0 sein Krümmungsverhalten, dann ist $W(x_0; f(x_0))$ ein Wendepunkt des Graphen von f .

Für eine auf einem offenen Intervall I_0 definierte und zweimal differenzierbare Funktion f gilt

Ist $f''(x_0) = 0$ und ändert f in x_0 sein Krümmungsverhalten, dann ist $W(x_0; f(x_0))$ ein Wendepunkt des Graphen von f .

Für eine auf einem offenen Intervall I_0 definierte und zweimal differenzierbare Funktion f gilt

a) Ist $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$, dann ist $E(x_0; f(x_0))$ ein Hochpunkt des Graphen von f .

b) Ist $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$, dann ist $E(x_0; f(x_0))$ ein Tiefpunkt des Graphen von f .

8. Tangenten

Die Gleichung einer Tangente im $P(x_0; f(x_0))$ lautet

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$
